



КОНСУЛ®



Привилегированная защита

Комбинированный фунгицид для защиты зерновых колосовых культур от комплекса заболеваний листьев и колоса

Действующее вещество: 125 г/л флутриафола + 125 г/л азоксистробина
Химический класс: триазолы + стробилурины
Препаративная форма: концентрат суспензии

Регламенты применения на территории Российской Федерации

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата, л/га	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая и желтая ржавчина, септориоз, пиренофороз	0,8–1,0	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых симптомов одного из заболеваний, последующие с интервалом 14–21 день. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	30(1-2)
	Фузариоз колоса	1,0	Опрыскивание в фазе колошение-начало цветения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	
Ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, темно-бурая и сетчатая пятнистость, ринхоспориоз		Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	30(1)

Номер государственной регистрации: 058-02-480-1