




## КОНСУЛ®



*Привилегированная защита*

**Комбинированный фунгицид для защиты зерновых колосовых культур от комплекса заболеваний листьев и колоса**

Действующее вещество: 125 г/л флутриафола + 125 г/л азоксистробина  
Химический класс: триазолы + стробилурины  
Препаративная форма: концентрат суспензии

### **Назначение**

Системный двухкомпонентный фунгицид для защиты озимой пшеницы и ярового ячменя от болезней листьев и колоса.

### **Механизм действия**

Наличие двух взаимодополняющих действующих веществ в составе препарата, отличающихся по механизму действия на патогены, обеспечивает длительное защитное и лечебное действие. Фунгицид обладает контактным, трансламинарным и системным действием.

### **Период защитного действия**

В течение 2–3 недель и более при применении фунгицида в оптимальные сроки, в зависимости от вида патогена, инфекционной нагрузки и погодных условий на момент обработки.

### **Скорость воздействия**

Сразу после высыхания рабочего раствора на листовой поверхности защищаемых растений.

### **Фитотоксичность**

При использовании препарата в строгом соответствии с рекомендациями по применению риск появления фитотоксичности для зерновых культур отсутствует. Избегайте сноса препарата на соседние культуры (азоксистробин фитотоксичен для большинства сортов яблони).

### **Возможность возникновения резистентности**

Консул – комбинированный фунгицид, содержащий два действующих вещества с разными механизмами действия, что обеспечивает предупреждение появления резистентных штаммов патогенов.

### **Совместимость с другими пестицидами**

Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов (например, Вантекс и Данадим Эксперт) применяемых в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае рекомендуется проверять смешиваемые компоненты на химическую совместимость.

**Класс опасности для человека: 2.**

**Класс опасности для пчел: 3.**

**Рекомендации по применению**

Опрыскивание в период вегетации зерновых культур, начиная с фазы выхода в трубку до конца колошения – формирования зерна.

Для обеспечения эффективной защиты культуры начинайте обработки фунгицидом при появлении первых симптомов одного из заболеваний или профилактически при наступлении условий благоприятных для развития одного из патогенов.

Опрыскивание проводить при помощи серийно выпускаемых штанговых опрыскивателей. Используйте достаточное количество рабочей жидкости для того, чтобы обеспечить полное смачивание защищаемой листовой поверхности. Норма расхода рабочей жидкости – 200–300 л/га.

**Хранение препарата**

Хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении при температуре от –5°С и до +25°С. Перед применением перемешать содержимое канистры.

**Срок годности**

3 года со дня изготовления препарата при соблюдении условий хранения.

**Упаковка**

Канистра 5 л

**Регистрант**

Кеминова А/С